


**Fachbeitrag**  
**zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)**  
**für einen Solarpark bei Kirchbuch (Beilngries II)**  
**Landkreis Eichstätt**

*Fassung mit Stand 01/2025*



**Abbildung 1:** Lage des Vorhabensgebiets (rot umrandet) bei Kirchbuch; (Hintergrundkarte: © OpenStreetMap contributors).

Auftraggeber: Anumar GmbH  
Haunwöhrer Straße 21  
85051 Ingolstadt

Auftragnehmer: Bachmann Artenschutz GmbH  
GF: Markus Bachmann  
Heideloffstraße 28  
91522 Ansbach

Bearbeiterin: Anita Schäffer (Dipl. Ing. Forstwirtschaft FH)

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung .....</b>                                                    | <b>4</b>  |
| 1.1      | Rechtliche Grundlagen.....                                                 | 11        |
| 1.2      | Datengrundlagen .....                                                      | 14        |
| 1.3      | Methodisches Vorgehen.....                                                 | 15        |
| <b>2</b> | <b>Wirkungen des Vorhabens auf Fauna und Flora .....</b>                   | <b>17</b> |
| 2.1      | Baubedingte Wirkfaktoren.....                                              | 17        |
| 2.2      | Anlagenbedingte Wirkfaktoren.....                                          | 17        |
| 2.3      | Betriebsbedingte Wirkfaktoren .....                                        | 17        |
| <b>3</b> | <b>Bestand und Darlegung der Betroffenheit von Arten .....</b>             | <b>18</b> |
| 3.1      | Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie .....                   | 19        |
| 3.2      | Tierarten nach Anhang IV a) der FFH-Richtlinie .....                       | 19        |
| 3.2.1    | Säugetiere .....                                                           | 19        |
| 3.2.2    | Reptilien .....                                                            | 19        |
| 3.2.3    | Amphibien, Libellen, Käfer, Tagfalter und Weichtiere .....                 | 22        |
| 3.3      | Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie.....         | 22        |
| 3.4      | Bestand und Betroffenheit von national geschützten/gefährdeten Arten ..... | 25        |
| <b>4</b> | <b>Maßnahmen .....</b>                                                     | <b>26</b> |
| 4.1      | Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung.....                                | 26        |
| 4.2      | CEF-Maßnahmen .....                                                        | 27        |
| 4.3      | Weitere Maßnahmenempfehlungen.....                                         | 27        |
| <b>5</b> | <b>Fazit .....</b>                                                         | <b>28</b> |
| <b>6</b> | <b>Literatur, Gesetze und Richtlinien, Internet .....</b>                  | <b>30</b> |
| <b>7</b> | <b>Anhang .....</b>                                                        | <b>33</b> |
| A        | Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie .....                              | 34        |
| B        | Vögel .....                                                                | 38        |

## Abkürzungsverzeichnis

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| ABSP       | Arten- und Biotopschutzprogramm des LfU                  |
| ASK        | Artenschutzkartierung des LfU                            |
| BArtSchV   | Bundesartenschutzverordnung                              |
| BayNatSchG | Bayerisches Naturschutzgesetz                            |
| BfN        | Bundesamt für Naturschutz                                |
| bg         | besonders geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG |
| BNatSchG   | Bundesnaturschutzgesetz                                  |
| EHZ        | Erhaltungszustand der Art                                |
| FFH        | Fauna Flora Habitat-Richtlinie                           |
| KBR        | Kontinentale biogeografische Region                      |
| LBP        | Landschaftspflegerischer Begleitplan                     |
| LfU        | Bayerisches Landesamt für Umwelt                         |
| sg         | streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG    |
| VRL        | Vogelschutzrichtlinie                                    |

### RL D Rote Liste Deutschland gem. BfN:

| Symbol | Kategorie                       |
|--------|---------------------------------|
| 0      | Ausgestorben oder verschollen   |
| 1      | Vom Aussterben bedroht          |
| 2      | Stark gefährdet                 |
| 3      | Gefährdet                       |
| G      | Gefährdung unbekannten Ausmaßes |
| R      | Extrem selten                   |
| V      | Vorwarnliste                    |
| D      | Daten unzureichend              |
| *      | Ungefährdet                     |
| ♦      | Nicht bewertet                  |

### RL BY Rote Liste Bayern:

| Gefährdungskategorien |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0                     | ausgestorben oder verschollen<br>(0* ausgestorben und 0 verschollen) |
| 1                     | vom Aussterben bedroht                                               |
| 2                     | stark gefährdet                                                      |
| 3                     | gefährdet                                                            |
| G                     | Gefährdung anzunehmen                                                |
| R                     | extrem selten<br>(R* äußerst selten und R sehr selten)               |
| V                     | Vorwarnstufe                                                         |
| •                     | ungefährdet                                                          |
| ••                    | sicher ungefährdet                                                   |
| D                     | Daten mangelhaft                                                     |

## 1 Einleitung

Ganz im Nordosten des Landkreises Eichstätt liegt die Gemeinde Beilngries. Etwa 8 km südlich der Stadt Beilngries und etwa 6,5 km östlich der Bundesautobahn A9 befindet sich die kleine Ortschaft Kirchbuch. Direkt am nordöstlichen Ortsausgang liegt nördlich der Staatsstraße EI22 Richtung Arnbuch das Gelände der Firma Altmühltaler-Bio-Ei. Auf gut 9 ha derzeit landwirtschaftlich genutzter Fläche nördlich angrenzend an die Betriebsgebäude soll ein Solarpark entstehen. Etwa die Hälfte der Fläche bildet ein Acker, die andere Hälfte besteht aus mit Zäunen und Gerüsten für die Hühnerhaltung versehenem Grünland. Im Norden grenzt das Vorhabensgebiet an Wald. Im Osten schließt sich eine weitere Ackerfläche mit einer Brache an, bevor der Wald beginnt, im Westen liegen weitere Ackerflächen. Im nordwestlichen Bereich des Vorhabensgebiets befindet sich eine Geländeformation ähnlich einer Doline oder ehemaligen Abbaustelle mit etwa 6-10 m Tiefe von der Geländeoberkante und teilweise steilen Hängen. Die Kanten sind mit Kalksteinfelsen und Steinen bedeckt und im Lauf des Jahres v.a. mit Brennesseln zugewuchert. Im westlichen Bereich der Geländevertiefung stehen an den Hängen heimische Gehölze. Durchzogen ist die Formation von mehreren kleinen Wasserläufen, die teilweise aus Rohren gespeist werden. Im Osten und Norden verlaufen entlang der Grenzen des Vorhabensgebiets Graswege, im Westen ein wassergebundener Wirtschaftsweg.


Das Vorhabensgebiet liegt im Naturpark Altmühltal. Der umliegende Wald ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes „Schutzzone im Naturpark Altmühltal“.

Als Untersuchungsgebiet wird das Vorhabensgebiet um etwa 100 m erweitert zum Offenland und etwa 20 m erweitert zu Wald definiert (**Abbildung 2**).

In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Eichstätt wird in diesem Zusammenhang das Untersuchungsgebiet auf die Artengruppen Vögel und Reptilien (Zauneidechse) geprüft. Die Anzahl der Begehungen, die Artengruppen sowie der Untersuchungsumfang (Gelände) wurden mit der unteren Naturschutzbehörde, Herrn Sachser, abgestimmt.

Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber wird davon ausgegangen, dass im Zusammenhang mit dem geplanten Solarpark keine Hühnerhaltung vorgesehen ist.





**Abbildung 2:** Übersicht über das Vorhabensgebiet (rot umrandet) innerhalb des Untersuchungsgebiets (blau umrandet); am unteren Bildrand die Ortschaft Kirchbuch (Hintergrundluftbild: © LfU, LDBV).



**Abbildung 3:** Blick in das Vorhabensgebiet von Ost nach West entlang des Zauns zwischen Flächen zur Hühnerhaltung und Acker (Foto: Bachmann Artenschutz GmbH).





**Abbildung 4:** Blick in das Vorhabensgebiet von der nordöstlichen Ecke am Waldrand Richtung Südwesten (Foto: Bachmann Artenschutz GmbH).



**Abbildung 5:** Im Norden trennt ein Grasweg das Vorhabensgebiet vom Wald (Foto: Bachmann Artenschutz GmbH).





**Abbildung 6:** Im Nordwesten des Vorhabensgebiets liegt eine teilweise mit Gehölzen bewachsene Geländevertiefung (Foto: Bachmann Artenschutz GmbH).



**Abbildung 7:** Das Gelände fällt mehrere Meter teilweise steil ab und ist mit Wasserläufen durchzogen (Foto: Bachmann Artenschutz GmbH).





**Abbildung 8:** An den steilen Hängen auf der Westseite finden sich Kalksteine bis zur Sohle (Foto: Bachmann Artenschutz GmbH).



**Abbildung 9:** Blick in das Vorhabensgebiet von Osten nach Westen entlang des Zauns (Foto: Bachmann Artenschutz GmbH).





**Abbildung 10, 11, 12:** Entlang der Einzäunung am Weg im Westen finden sich unterschiedliche Strukturen wie Stein, Holz- und Reisighaufen unter alten (Obst-)Bäumen (Fotos: Bachmann Artenschutz GmbH).



**Abbildung 13:** Zwischen und neben den Gebäudekomplexen sind die Auslaufbereiche der Hühner teilweise mit Gehölzen bestanden; im Hintergrund rechts im Bild die offene Freilauf- bzw. Ackerfläche (Foto: Bachmann Artenschutz GmbH).



## 1.1 Rechtliche Grundlagen

Die mögliche projektbedingte Betroffenheit europarechtlich geschützter Arten i. S. der artenschutzrechtlichen Vorgaben des **§ 44 Abs. 1 BNatSchG** i.V.m. **§ 44 Abs. 5 BNatSchG** ist im Rahmen eines Fachbeitrages zu überprüfen. Aus diesem Grund wurde die Bachmann Artenschutz GmbH beauftragt, den vorliegenden Fachbeitrag zur saP zu erarbeiten.


Die streng und besonders geschützten Arten sind in **§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG** definiert. Bei den **besonders geschützten Arten** handelt es sich gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG um Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der EG-Artenschutzverordnung aufgeführt sind. Besonders geschützt sind darüber hinaus die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, alle europäischen Vogelarten i. S. des Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie sowie Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 Spalte 2 und 3 zu § 1 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV).

Die **streng geschützten Arten** sind eine Teilmenge der besonders geschützten Arten. Streng geschützt sind die Arten des Anhangs A der EG-Artenschutzverordnung, des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie der Anlage 1 Spalte 3 zu § 1 BArtSchV.

Im Rahmen der saP sind grundsätzlich alle in Bayern vorkommenden Arten der folgenden zwei Gruppen zu berücksichtigen:

1. die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
2. die europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VRL

*Anmerkung: Die grundsätzlich ebenfalls zu berücksichtigenden „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG müssen erst in einer neuen Bundesartenschutzverordnung bestimmt werden. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.*



**Abbildung 14:** Übersicht über die Beziehung der verschiedenen nationalen und europäischen Schutzkategorien der Tier- und Pflanzenarten zueinander (aus LfU 2018)

Gemäß **§ 44 Abs. 1 BNatSchG** ist es verboten:

- wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
- wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
- Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
- wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Um Verstöße gegen die genannten Verbote durch das Vorhaben zu vermeiden, werden im vorliegenden Fachbeitrag einzuhaltende Schutzmaßnahmen und CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) formuliert (siehe Kapitel 4). Dazu ist §44 Abs.5 BNatSchG zu beachten:

#### **§44 Absatz 5 BNatSchG:**

Für nach **§ 15 Absatz 1 BNatSchG** unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der FFH-Richtlinie aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen

- das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,
- das Verbot des Nachstellens und Fangens wildlebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (= CEF-Maßnahmen) gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,
- das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.



Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden (= CEF-Maßnahmen). Für Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IV b der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend.

Bei **nicht vermeidbaren Verbotstatbeständen** ist der **§ 45 Abs. 7 BNatSchG** zu prüfen. Dieser regelt die Ausnahmegründe der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden von den o. g. Verbotstatbeständen.

**In dem vorliegendem Fachbeitrag zur saP wurde überprüft, ob**


- artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) durch das Vorhaben erfüllt werden,
- ggf. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind.

Anmerkung zum Kasten:

Über die o.g. „europarechtlich geschützten“ Gruppen hinaus ist nach nationalem Recht noch eine große Anzahl weiterer Arten „besonders oder streng geschützt“. Diese sind nicht Gegenstand des Fachbeitrags zur saP. Für diese Arten liegt nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor. Inwieweit einzelne dieser nach nationalem Recht besonders oder streng geschützten Arten bei einer Neufassung der Bundesartenschutzverordnung (s.o.) künftig als „nationale Verantwortungsarten“ wieder zu Prüfgegenständen des Fachbeitrages zur saP werden, bleibt bis zur entsprechenden Neufassung der Bundesartenschutzverordnung dahingestellt. Die Nichtberücksichtigung von Arten im Rahmen des Fachbeitrages zur saP bedeutet jedoch nicht, dass dieses Artenspektrum bei der naturschutzfachlichen Bewertung völlig außer Betracht bleiben kann. Die Arten sind weiterhin Gegenstand der Eingriffsregelung. Die Eingriffsregelung als naturschutzrechtliche Auffangregelung hat mit ihrer Eingriffsdefinition und Folgenbewältigungskaskade einen umfassenden Ansatz, der den Artenschutz insgesamt und damit auch diese Arten als Teil des Naturhaushaltes umfasst (§ 14 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 2 und 3 BNatSchG).

Sogenannte „**Allerweltsarten**“, die zwar im Raum vorkommen können, bei denen aber Beeinträchtigungen i. S. der Verbote des § 44 Abs. 1 bis 4 BNatSchG ohne vertiefende Prüfung auszuschließen sind, bleiben unberücksichtigt. Für diese Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin erhalten bleibt bzw. sich der Erhaltungszustand ihrer lokalen Population nicht signifikant verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden, soweit keine größere Anzahl Individuen/ Brutpaare betroffen sind.

Arten, die bei den Kartierarbeiten im Untersuchungsgebiet trotz Einhaltung der Methodenstandards nicht aufgefunden werden konnten, werden laut Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung – Prüfablauf (LfU 2020c) nicht weiter berücksichtigt (nachfolgende Abbildung 1).



**Abbildung 15:** Prüfablauf laut LfU 2020c (dort Abbildung 1)

## 1.2 Datengrundlagen

Als Datengrundlagen wurden herangezogen:

- Planunterlagen vom Auftraggeber
- Auswertung vorhandener behördlichen Daten: ASK, Biotopkartierung
- Artinformationen des LfU: <https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen>
- Ortsbegehungen zur Erfassung der Strukturen im Untersuchungsgebiet, siehe Kapitel 1.3
- Erhebung faunistischer Daten: 6 Begehungen zur Artengruppe Vögel, 4 Begehungen zur Artengruppe Reptilien (Zauneidechse) 2024
- Arteninformationen zu Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie des BfN (Bundesamt für Naturschutz 2019)
- BayernAtlas (Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, 2020)



### 1.3 Methodisches Vorgehen

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen sich auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 20. August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ mit Stand 08/2018. Berücksichtigt sind außerdem die Hinweise der Internet-Arbeitshilfe des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zur speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenzulassung (LfU Stand 2020a, 2020b, 2020c).

#### Das systematische Vorgehen gliedert sich in 5 Prüfschritte:

1. Relevanzprüfung („Abschichtung“) aller in Bayern vorkommenden, europarechtlich geschützten Arten nach festgelegten Kriterien mit der saP-Internetarbeitshilfe des LfU.  
„Prüfrelevant“ sind die europarechtlich geschützten Arten dann, wenn sie in dem vom Projekt betroffenen Raum vorkommen und zudem von der Maßnahme beeinträchtigt werden könnten, d. h. sensibel gegenüber den zu erwartenden Wirkungen sind (siehe Kap. 2).
2. Bestandserfassung der vorkommenden, europarechtlich geschützten Arten bzw. Potenzialanalyse im Untersuchungsgebiet sowie ggf. Auswertung weiterer, zur Verfügung stehender Informationen (Kap. 1.2).
3. Prüfung der Verbotstatbestände im Hinblick auf die projektbedingten Wirkungen, ggfs. Festlegung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen bzw. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen. Die projektbedingte Betroffenheit der Arten wird in Artenblättern dargestellt.
4. Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG, falls erforderlich
5. Berücksichtigung von sonstigen Artenschutzbelangen, falls zutreffend

Das relevante Untersuchungsgebiet entspricht dem Wirkraum auf die potenziell vorkommenden Arten.

Arten, die zwar im Untersuchungsgebiet vorkommen bzw. vorkommen können, bei denen auf Grundlage der zu erwartenden Projektwirkungen erhebliche Beeinträchtigungen aber ausgeschlossen werden können, bleiben bei den weiteren Prüfschritten unberücksichtigt.

Nachweise der **Avifauna** wurden durch Sichtbeobachtungen, mit einem Fernglas (Meopta 10\*42 HD) sowie durch Verhören ermittelt. Alle Beobachtungen werden auf Karten und Luftbildern notiert und am Ende des Beobachtungszeitraumes ausgewertet. Der Brutstatus wurde nach allgemein gültigen Regeln beurteilt (SÜDBECK et al., 2005).

Getrennt von den Brutvögeln werden in der Auswertung immer auch offenkundige Gastvögel ermittelt (beispielsweise Nahrungsgäste, überfliegende Vögel, rastende Zugvögel, Wintergäste).

**Tabelle 1:** Zeit und Wetterbedingungen während der Begehungen zur Erfassung der Avifauna

| Datum      | Beginn | Ende  | Stunden | Wetter                         |
|------------|--------|-------|---------|--------------------------------|
| 22.04.2024 | 10:00  | 11:00 | 1       | Sonnig, 12° C                  |
| 06.05.2024 | 10:00  | 11:00 | 1       | Leicht bewölkt, 17° C          |
| 21.05.2024 | 07:45  | 08:45 | 1       | Bedeckt, 15° C                 |
| 04.06.2024 | 09:00  | 10:00 | 1       | Sonnig, 20° C                  |
| 25.06.2024 | 09:30  | 10:30 | 1       | Sonnig, 18° C                  |
| 02.07.2024 | 07:00  | 08:00 | 1       | Aufgelockerte Bewölkung, 17° C |

Das methodische Vorgehen zur Erfassung der **Zauneidechse** erfolgt über die Erhebung der Aktivität im Untersuchungsgebiet. Im Zeitraum Mai und Juni bzw. Juli erfolgt die Erfassung für Adulte bzw. Subadulte. Für die Datenerhebung sind vier Begehungen bei sonnigem Wetter an ausgewählten Bereichen mit einer Geschwindigkeit von 250 m/h durchgeführt worden. Hierbei wurden für die Art relevante Strukturen gezielt abgesucht. Das Auswahlkriterium ist unter anderem eine lückige Vegetation mit sonnenexponierter Lage. Grabfähiges Material und Versteckmöglichkeiten (zur Reproduktion und Wintereinstand) wurden mitberücksichtigt. Auf das Auslegen künstlicher Versteckmöglichkeiten wurde verzichtet, da diese in einem nicht relevanten Maß von der Zauneidechse besucht werden. Da ein Vorkommen der Zauneidechse festgestellt werden konnte, wurde auf einen Kartiertermin im August (Juv.) verzichtet.

**Tabelle 2:** Zeit und Wetterbedingungen während der Begehungen zur Erfassung der Zauneidechse

| Datum      | Beginn | Ende  | Stunden | Wetter                         |
|------------|--------|-------|---------|--------------------------------|
| 21.05.2024 | 09:00  | 09:30 | 0,5     | Aufgelockerte Bewölkung, 17° C |
| 04.06.2024 | 10:00  | 10:30 | 0,5     | Sonnig, 21° C                  |
| 25.06.2024 | 10:30  | 11:00 | 0,5     | Sonnig, 20° C                  |
| 02.07.2024 | 08:30  | 09:00 | 0,5     | Sonnig, 18° C                  |

Anmerkung: Mitte April 2024 erfolgte ein starker Wintereinbruch, weswegen die Kartiertermine später ins Jahr verschoben werden mussten. Ende Mai/Anfang Juni gab es stellenweise verheerende Starkregenereignisse mit Überschwemmungen.

## **2 Wirkungen des Vorhabens auf Fauna und Flora**

Wirkfaktoren, die in der Regel Beeinträchtigungen und Störungen der europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten i. S. der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verursachen können, sind nachfolgend aufgeführt.

### **2.1 Baubedingte Wirkfaktoren**

Baubedingte Wirkfaktoren sind überwiegend zeitlich begrenzte Wirkfaktoren, die während der Bauphase verursacht werden. Baubedingte Wirkungen ergeben sich aus der unmittelbaren Bautätigkeit. Bei diesem Vorhaben scheinen folgende Faktoren relevant:

- Störung, Verletzung und Tötung von am Boden brütenden Vögeln und Zerstörung derer Nester durch Baufeldräumung und sonstiger Bautätigkeiten innerhalb der Vogelbrutzeit
- Störung, Verletzung und Tötung von in und an Hecken brütenden Vögeln und Zerstörung derer Nester und Gelege durch Gehölzentfernungen und sonstiger Bautätigkeiten innerhalb der Vogelbrutzeit
- Störung der Tiere durch Emissionen im Baubetrieb: Lärm, Abgas, Staub, Erschütterungen und optische Reize
- Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Feldvögel durch vorübergehende Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen

### **2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren**

Anlagebedingte Wirkfaktoren sind die dauerhaften, von den baulichen Anlagen verursachten Beeinträchtigungen. Anlagebedingte Wirkungen ergeben sich aus den dauerhaften (neuen) Anlagen. Bei diesem Vorhaben scheinen folgende Faktoren relevant:

- dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Feldvögel durch Umnutzung und Überbauung von Freiflächen
- dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für heckenbewohnende Vögel durch dauerhafte Beseitigung von Gehölzstrukturen und Altgrasbereichen
- Beeinträchtigung von Tieren durch Blendwirkung der Solarmodule
- Zerschneidung des Lebensraums durch Zäune
- Veränderung des Landschaftsbildes (Kulissenwirkung)

### **2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren**

Betriebsbedingte Wirkfaktoren sind die mit dem Betrieb verbundenen Wirkungen. Bei diesem Vorhaben spielen folgende Faktoren eine Rolle:

- Verletzung und Tötung von Tieren bei der Pflege des Solarparks



### 3 Bestand und Darlegung der Betroffenheit von Arten

Es ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote:

**Schädigungsverbot von Lebensstätten** (siehe Nr. 2.1 der Formblätter):

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).

**Störungsverbot** (siehe Nr. 2.2 der Formblätter):

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

**Tötungs- und Verletzungsverbot** (siehe Nr. 2.3 der Formblätter):

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,

wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG);

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG).

### 3.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie

Im Untersuchungsgebiet kommen keine europarechtlich geschützten Pflanzenarten (FFH-Richtlinie Anhang IV b) vor.

### 3.2 Tierarten nach Anhang IV a) der FFH-Richtlinie

#### 3.2.1 Säugetiere

Entlang von linearen Strukturen wie Wald- und Wegränder sowie im freien Luftraum über den Feldern ist mit jagenden **Fledermäusen** zu rechnen. Die Fortpflanzungsstätten liegen außerhalb des Vorhabensgebietes. Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen in Kapitel 4 kann ausgeschlossen werden, dass jagende Fledermäuse durch das Bauvorhaben beeinträchtigt werden.

Weitere saP-relevante Säugetierarten können aufgrund der Verbreitung der Arten und der vorhandenen Habitatstrukturen ausgeschlossen werden.

Bei Berücksichtigung der in Kapitel 4 aufgeführten Maßnahmen werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt.

#### 3.2.2 Reptilien

Nach den natürlichen Verbreitungsgebieten der Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Untersuchungsgebiet Vorkommen der Zauneidechse möglich. Die **Zauneidechse** wurde an der Oberkante der Geländevertiefung im Westen des Vorhabensgebiets erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass die Geländevertiefung und somit der Lebensraum der Zauneidechse bestehen bleiben. Des Weiteren eignet sich der südexponierte, vom Vorhabensgebiet durch einen breiten Grasweg getrennte Waldrand für die Zauneidechse, hier wurden jedoch keine Tiere beobachtet. Der Waldrand ist durch einen breiten Grasweg vom Vorhabensgebiet getrennt, so dass hier ggf. keine Beeinträchtigungen erwartet werden. Im übrigen Untersuchungsgebiet kommen keine geeigneten Habitatstrukturen für die Zauneidechse vor.

Bei Berücksichtigung der in Kapitel 4 aufgeführten Maßnahmen werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt.

#### **Zauneidechse (*Lacerta agilis*)**

Tierart **nach Anhang IV a) FFH-RL**

##### **1 Grundinformationen**

**Rote-Liste Status Deutschland: V**

**Bayern: 3**

**Art im UG:** ☒ **nachgewiesen**

☐ **potenziell möglich**

**Erhaltungszustand** der Art auf Ebene der kontinentalen Region

☐ günstig     
 ☒ ungünstig – unzureichend     
 ☐ ungünstig – schlecht

Die Zauneidechse besiedelt strukturreiche Gebüsch-Offenland-Komplexe mit Möglichkeiten zur Thermoregulation, geeigneten Eiablageplätzen, isolierten Winterquartieren und Vorkommen von Beutetieren. Dabei sind wärmebegünstigte Stellen zum Sonnen (Steine, Holz, Hang mit offenem Boden usw.) genauso wichtig wie Versteckmöglichkeiten vor zu hohen Temperaturen und Prädatoren (Hohlräume, Gehölze usw.). Durch Habitatverluste und die großflächige Zerschneidung der Lebensräume geht der Bestand drastisch zurück.

**Lokale Population:**

In der abwechslungsreichen Kulturlandschaft in Teilen des Landkreises Eichstätt findet die Zauneidechse geeigneten Lebensraum. Als lokale Population werden die Tiere zwischen der Ortschaft Kirchbuch und den Waldrändern definiert.

Der **Erhaltungszustand** der **lokalen Population** wird demnach bewertet mit:

☐ hervorragend (A)     
 ☐ gut (B)     
 ☐ mittel – schlecht (C)     
 ☒ unbekannt (D)

**2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG**

Ein Vorkommen der Zauneidechse wurde an der Geländevertiefung im Westen des Vorhabensgebiets festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die für die Zauneidechse geeigneten Strukturen erhalten bleiben.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

- **M01:** Rund um die Geländevertiefung muss während der Bauarbeiten ein 5 m breiter Pufferstreifen eingehalten werden. Dieser Bereich darf weder befahren werden, noch dürfen hier Baumaterialien gelagert werden. Der Pufferstreifen ist durch einen nicht verrückbaren Bauzaun von der Baustelle abzutrennen.

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: -

**Schädigungsverbot ist erfüllt:**      ☐ ja      ☒ nein

**2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG**

Durch Bautätigkeiten unmittelbar angrenzend an die Geländevertiefung ist mit einem erhöhten Störungsrisiko für Zauneidechsen zu rechnen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

- **M01:** Rund um die Geländevertiefung muss während der Bauarbeiten ein 5 m breiter Pufferstreifen eingehalten werden. Dieser Bereich darf weder befahren werden, noch dürfen hier Baumaterialien gelagert werden. Der Pufferstreifen ist durch einen nicht verrückbaren Bauzaun von der Baustelle abzutrennen.



☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: -

**Störungsverbot ist erfüllt:** ☐ ja ☒ nein

### 2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 BNatSchG

Durch Bautätigkeiten unmittelbar angrenzend an die Geländevertiefung ist mit einem erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisiko für Zauneidechsen zu rechnen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

- **M01:** Rund um die Geländevertiefung muss während der Bauarbeiten ein 5 m breiter Pufferstreifen eingehalten werden. Dieser Bereich darf weder befahren werden, noch dürfen hier Baumaterialien gelagert werden. Der Pufferstreifen ist durch einen nicht verrückbaren Bauzaun von der Baustelle abzutrennen.

**Tötungsverbot ist erfüllt:** ☐ ja ☒ nein



**Abbildung 16:** Verortung des im Untersuchungsgebiet (blaue Umrandung) festgestellten Zauneidechsen-Vorkommens; (Hintergrundluftbild: © LfU, LDBV).

### 3.2.3 Amphibien, Libellen, Käfer, Tagfalter und Weichtiere

Im Untersuchungsgebiet kommen keine geeigneten Habitatstrukturen für nach Anhang IV a) der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen Amphibien, Libellen, Käfer, Tagfalter und Weichtiere vor. Es werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt.

### 3.3 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie

Im Untersuchungsgebiet konnten verschiedene Vogelarten nachgewiesen werden.

Die landwirtschaftlichen Offenflächen eignen sich ab einer Entfernung von etwa 60-100 m zum Waldrand generell als Lebensraum der **Feldlerche**. Im Untersuchungsgebiet wurden zwei Reviere der Feldlerche festgestellt, die jedoch außerhalb des Vorhabensgebiets liegen und nicht beeinträchtigt werden (Abbildung 20). Eine Brutansiedlung innerhalb des Vorhabensgebiets in ausreichender Entfernung zum Wald ist nicht auszuschließen.

#### Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Europäische Vogelart nach VRL

##### 1 Grundinformationen

Rote-Liste Status Deutschland: 3

Bayern: 3

Art im UG: ☒ nachgewiesen

☐ potenziell möglich

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Region

☐ günstig

☐ ungünstig – unzureichend

☒ ungünstig – schlecht

Bevorzugte Lebensräume der Feldlerche sind offene Kulturlandschaften, mit niedriger, lückiger und stufiger Vegetation. Auch Heideflächen und Brachland werden oft genutzt. Als Brutareal werden Äcker, bewirtschaftete Weiden und Wiesen bevorzugt, wobei hier die Brutverluste durch eine intensive Landwirtschaft am höchsten ist. Ausweichmöglichkeiten bieten dann Feldraine. Der bodenbrütende Vogel meidet Sichtbarrieren wie Hecken etc.. Das Nahrungsspektrum der Feldlerche reicht von eiweißreichen Insekten, Spinnen und Würmer über Samen, bis hin zu kleinen Pflanzentrieben.

##### Lokale Population:

In den offenen landwirtschaftlichen Nutzflächen im Landkreis Eichstätt finden Feldlerchen noch geeigneten Lebensraum. Als lokale Population werden die Vögel rund um Kirchbuch bis an die geschlossenen Waldflächen angenommen.

Der **Erhaltungszustand** der lokalen Population wird demnach bewertet mit:

☐ hervorragend (A)

☐ gut (B)

☐ mittel – schlecht (C)

☒ unbekannt (D)

## 2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Die landwirtschaftlichen Offenflächen ab einer Entfernung von etwa 60-100 m zum Waldrand eignen sich generell als Lebensraum der Feldlerche. Zwei Reviere der Feldlerche wurden im Untersuchungsgebiet festgestellt, jedoch außerhalb des Vorhabensgebiets. Eine Brutansiedlung innerhalb des Vorhabensgebiets ist nicht auszuschließen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

- **M02:** Die unbebauten Flächen der Anlage (Flächen zwischen den Photovoltaikmodulen) sind als extensive Wiesen oder Weiden (ohne Düngung und Pestizideinsatz) zu nutzen. Es wird Selbstbegrünung oder Einsaat von gebietsheimischem, arten- und blütenreichem Saatgut empfohlen. Die Grünflächen im Bereich der Module dürfen jährlich maximal zwei Mal ab Mitte Mai gemäht werden, Mahd mit Balkenmäher. Das Mahdgut ist zwingend zu entfernen.
- **M03:** Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist auf der ganzen Fläche unzulässig.

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: -

**Schädigungsverbot ist erfüllt:** ☐ ja ☒ nein

## 2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Im Rahmen der Baufeldräumung und Bauarbeiten kann es zu Störungen brütender Vögel kommen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

- **M04:** In den Monaten März bis Juni ist eine Vergrämung der Bodenbrüter vor und während der Bauphase bei Baustopps zwingend nötig, damit die Vögel den Bereich der Baufläche nicht als Brutrevier besiedeln. Hierfür müssen ca. 2 m hohe Stangen (über Geländeoberfläche) mit daran befestigten Absperrbändern von ca. 1-2 m Länge innerhalb der eingriffsrelevanten Fläche aufgestellt werden. Die Stangen müssen in regelmäßigen Abständen von etwa 25 m aufgestellt werden.

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: -

**Störungsverbot ist erfüllt:** ☐ ja ☒ nein

## 2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 BNatSchG

Es ist mit einem erhöhten Tötungs- oder Verletzungsrisiko zu rechnen, wenn der Beginn der Bauphase in die Brutzeit der Feldlerche fällt.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

- **M04:** In den Monaten März bis Juni ist eine Vergrämung der Bodenbrüter vor und während der Bauphase bei Baustopps zwingend nötig, damit die Vögel den Bereich der Baufläche nicht als Brutrevier besiedeln. Hierfür müssen ca. 2 m hohe Stangen (über Geländeoberfläche) mit daran befestigten

Absperrbändern von ca. 1-2 m Länge innerhalb der eingriffsrelevanten Fläche aufgestellt werden.  
Die Stangen müssen in regelmäßigen Abständen von etwa 25 m aufgestellt werden.

**Tötungsverbot ist erfüllt:**    ☐ ja    ☒ nein

Aus der Gilde der Heckenbrüter wurde im Untersuchungsgebiet ein Revier der **Dorngrasmücke** in den Gehölzen am Teich außerhalb des Vorhabensgebiets, jenseits der Straße erfasst, das ebenfalls nicht beeinträchtigt wird. Weiterhin wurden **Goldammer** und **Stieglitz** beobachtet oder verhört; Brutreviere dieser Arten konnten nicht festgestellt werden.

Am Waldrand im Norden des Vorhabensgebiets liegt ein Revier des **Mäusebussards**, ebenfalls außerhalb des Vorhabensgebiets und davon unbeeinträchtigt. Als Nahrungsgäste bzw. überfliegend wurden weiterhin **Turmfalke** und **Rotmilan** beobachtet. Im Bereich der Gebäude wurden brütende Haussperlinge registriert, die Anlagen und Zäune nutzten **Stare** als Sitzwarten und **Braunkehlchen** auf dem Zug. **Rauchschwalben** und **Mehlschwalben** konnten über dem Vorhabensgebiet bei der Nahrungssuche beobachtet werden. Die Fortpflanzungsstätten dieser Arten liegen außerhalb des Untersuchungsgebiets und werden vom Vorhaben nicht betroffen.

Bei Berücksichtigung der in Kapitel 4 aufgeführten Maßnahmen werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt.

**Tabelle 3:**      Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen saP-relevanten Vogelarten, Legende siehe Abkürzungsverzeichnis am Beginn dieses Fachbeitrags.

| Deutscher Name      | Wissenschaftl. Name             | Verhalten                                                                  | RL<br>D  | RL<br>BY | Erhaltung<br>-zustand |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|
| Braunkehlchen       | <i>Saxicola rubetra</i>         | rastend                                                                    | 2        | 1        | schlecht              |
| Dorngrasmücke       | <i>Sylvia communis</i>          | Brutvogel im Untersuchungsgebiet                                           | -        | V        | gut                   |
| Feldlerche          | <i>Alauda arvensis</i>          | Brutvogel im Untersuchungsgebiet                                           | 3        | 3        | schlecht              |
| Haussperling        | <i>Passer domesticus</i>        | Brutvogel an Gebäuden im Untersuchungsgebiet                               | V        | V        | ungünstig             |
| <b>Mäusebussard</b> | <b><i>Buteo buteo</i></b>       | <b>Brutvogel im nördlich angrenzenden Wald, Nahrungsgast, überfliegend</b> | -        | -        | <b>gut</b>            |
| Mehlschwalbe        | <i>Delichon urbicum</i>         | Nahrungsgast, überfliegend                                                 | 3        | 3        | ungünstig             |
| Rauchschwalbe       | <i>Hirundo rustica</i>          | Nahrungsgast, überfliegend                                                 | 3        | V        | ungünstig             |
| <b>Rotmilan</b>     | <b><i>Milvus milvus</i></b>     | <b>Nahrungsgast, überfliegend</b>                                          | <b>V</b> | -        | <b>gut</b>            |
| Star                | <i>Sturnus vulgaris</i>         | rastend                                                                    | -        | 3        | gut                   |
| <b>Turmfalke</b>    | <b><i>Falco tinnunculus</i></b> | <b>Nahrungsgast, überfliegend</b>                                          | -        | -        | <b>gut</b>            |

**fett**      streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG)





**Abbildung 17:** Verortung der im Untersuchungsgebiet (blaue Umrandung) festgestellten Brutreviere (orange Punkte); Hintergrundluftbild: © LfU, LDBV).

### 3.4 Bestand und Betroffenheit von national geschützten/gefährdeten Arten

Am Waldrand nördlich angrenzend an das Vorhabensgebiet wurde ein Vorkommen der **Großen Wiesenameise** (*Formica pratensis*) (RL D: V, RL By: 3) erfasst. Der Ameisenhaufen liegt jenseits des Weges zwischen Vorhabensgebiet und Waldrand. Es wird davon ausgegangen, dass der Ameisenhaufen nicht von Bautätigkeiten sowie vom Bauvorhaben beeinträchtigt wird. Es werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt.



**Abbildung 18:** Der Ameisenhaufen am Waldrand wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt (Foto: Bachmann Artenschutz).

## 4 Maßnahmen

### 4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung

Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vermeidungsmaßnahmen. Diese sind daher unbedingt einzuhalten:

- **M01:** Rund um die Geländevertiefung muss während der Bauarbeiten ein 5 m breiter Pufferstreifen eingehalten werden. Dieser Bereich darf weder befahren werden, noch dürfen hier Baumaterialien gelagert werden. Der Pufferstreifen ist durch einen nicht verrückbaren Bauzaun von der Baustelle abzutrennen.
- **M02:** Die unbebauten Flächen der Anlage (Flächen zwischen den Photovoltaikmodulen) sind als extensive Wiesen oder Weiden (ohne Düngung und Pestizideinsatz) zu nutzen. Es wird Selbstbegrünung oder Einsaat von gebietsheimischem, arten- und blütenreichem Saatgut empfohlen. Die Grünflächen im Bereich der Module dürfen jährlich maximal zwei Mal ab Mitte Mai gemäht werden, Mahd mit Balkenmäher. Das Mahdgut ist zwingend zu entfernen.
- **M03:** Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist auf der ganzen Fläche unzulässig.
- **M04:** In den Monaten März bis Juni ist eine Vergrämung der Bodenbrüter vor und während der Bauphase bei Baustopps zwingend nötig, damit die Vögel den Bereich der Baufläche nicht als Brutrevier besiedeln. Hierfür müssen ca. 2 m hohe Stangen (über Geländeoberfläche) mit daran befestigten Absperrbändern von ca. 1-2 m Länge innerhalb der eingriffsrelevanten Fläche aufgestellt werden. Die Stangen müssen in regelmäßigen Abständen von etwa 25 m aufgestellt werden.
- **M05:** Wo nicht zwangsläufig Gehölze zur Umsetzung des Bauvorhabens entfernt werden müssen, muss die momentane Vegetation erhalten bleiben. Zu Gehölzen und Waldrändern, die nicht durch einen Wirtschaftsweg von der geplanten PV-Anlage getrennt sind, muss dauerhaft ein 5 m breiter Pufferstreifen eingehalten werden. In diesem Bereich muss ein Altgrasstreifen entwickelt werden. Hierfür muss dieser Bereich einmal jährlich, allerdings frühestens ab 15. Juli, gemäht werden. Das Mahdgut ist abzutransportieren.
- **M06:** Um Störungen und Verluste von jagenden Fledermausindividuen während der Baumaßnahmen zu vermeiden, ist auf Nachtbaustellen in der Zeit von April bis Oktober zu verzichten.

#### 4.2 CEF-Maßnahmen

CEF-Maßnahmen sind Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (= vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen) i.S.v. §44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG.

Sie sollen betroffene Lebensräume und Arten in einen Zustand versetzen, der es den Populationen ermöglicht, einen geplanten Eingriff schadlos zu verkraften. Diese müssen rechtzeitig, also vor Beginn der Baumaßnahmen, umgesetzt werden, um ihre Wirksamkeit bereits vor dem Eingriff zu garantieren.

Es sind keine **CEF-Maßnahmen** nötig.

#### 4.3 Weitere Maßnahmenempfehlungen

Folgende Maßnahmen sind Empfehlungen. Eine Umsetzung ist zwar nicht verpflichtend, dennoch kann oftmals mit wenig Aufwand eine Verbesserung für die lokalen Populationen erreicht werden.

- **M07:** Der Zaun um die PV-Anlage muss eine Bodenfreiheit von im Mittel 15 cm haben, um flugunfähigen Jungvögeln und Niederwild ungehinderten Zugang zu ermöglichen.
- **M08:** Die während der Bauphase beanspruchte Fläche ist auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren.
- **M09:** Im Rahmen der Pflege des Solarparks soll die Vegetation an den Rändern der bzw. in der Geländevertiefung wo möglich mit gemäht werden, um offene Flächen für die Zauneidechse zu gewährleisten und somit das Habitat zu verbessern.

## 5 Fazit

Aus dem Spektrum der europäisch geschützten Arten in Bayern wurden in den Gruppen **Säugetiere**, **Reptilien** und **Vögel** Arten ermittelt, die im Untersuchungsgebiet vorkommen oder zu erwarten sind.

Für alle untersuchten prüfungsrelevanten Arten sind die projektspezifischen Wirkungen unter Berücksichtigung der in diesem Fachbeitrag vorgeschlagenen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen im Kapitel 3 so gering, dass

- die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt,
- eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes durch anlagen-, bau- oder betriebsbedingte Störungen aller Voraussicht nach ausgeschlossen werden kann,
- sich das Tötungsrisiko vorhabensbedingt nicht signifikant erhöht.

Die Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt daher.

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für vorhandene oder potentiell zu erwartenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie bzw. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie ist die Umsetzung folgender Maßnahmen erforderlich:

**Tabelle 4:** Maßnahmenübersicht

| Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maßnahmentyp               | Ausführung                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>M01:</b> Rund um die Geländevertiefung muss während der Bauarbeiten ein 5 m breiter Pufferstreifen eingehalten werden. Dieser Bereich darf weder befahren werden, noch dürfen hier Baumaterialien gelagert werden. Der Pufferstreifen ist durch einen nicht verrückbaren Bauzaun von der Baustelle abzutrennen.                                                                                                                                   | Vermeidung (verpflichtend) | Beachtung bei der Planung und während der Ausführung |
| <b>M02:</b> Die unbebauten Flächen der Anlage (Flächen zwischen den Photovoltaikmodulen) sind als extensive Wiesen oder Weiden (ohne Düngung und Pestizideinsatz) zu nutzen. Es wird Selbstbegrünung oder Einsaat von gebietsheimischem, arten- und blütenreichem Saatgut empfohlen. Die Grünflächen im Bereich der Module dürfen jährlich maximal zwei Mal ab Mitte Mai gemäht werden, Mahd mit Balkenmäher. Das Mahdgut ist zwingend zu entfernen. | Vermeidung (verpflichtend) | Beachtung bei der Planung und dauerhaft              |
| <b>M03:</b> Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist auf der ganzen Fläche unzulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vermeidung (verpflichtend) | Beachtung bei der Planung und dauerhaft              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>M04:</b> In den Monaten März bis Juni ist eine Vergrämung der Bodenbrüter vor und während der Bauphase bei Baustopps zwingend nötig, damit die Vögel den Bereich der Baufläche nicht als Brutrevier besiedeln. Hierfür müssen ca. 2 m hohe Stangen (über Geländeoberfläche) mit daran befestigten Absperrbändern von ca. 1-2 m Länge innerhalb der eingriffsrelevanten Fläche aufgestellt werden. Die Stangen müssen in regelmäßigen Abständen von etwa 25 m aufgestellt werden.                                              | Vermeidung<br>(verpflichtend) | Beachtung bei der Planung sowie vor und während der Ausführung |
| <b>M05:</b> Wo nicht zwangsläufig Gehölze zur Umsetzung des Bauvorhabens entfernt werden müssen, muss die momentane Vegetation erhalten bleiben. Zu Gehölzen und Waldrändern, die nicht durch einen Wirtschaftsweg von der geplanten PV-Anlage getrennt sind, muss dauerhaft ein 5 m breiter Pufferstreifen eingehalten werden. In diesem Bereich muss ein Altgrasstreifen entwickelt werden. Hierfür muss dieser Bereich einmal jährlich, allerdings frühestens ab 15. Juli, gemäht werden. Das Mahdgut ist abzutransportieren. | Vermeidung<br>(verpflichtend) | Beachtung bei der Planung und dauerhaft                        |
| <b>M06:</b> Um Störungen und Verluste von jagenden Fledermausindividuen während der Baumaßnahmen zu vermeiden, ist auf Nachtbaustellen in der Zeit von April bis Oktober zu verzichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vermeidung<br>(verpflichtend) | Beachtung bei der Planung sowie während der Ausführung         |
| <b>M07:</b> Der Zaun um die PV-Anlage muss eine Bodenfreiheit von im Mittel 15 cm haben, um flugunfähigen Jungvögeln und Niederwild ungehinderten Zugang zu ermöglichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Empfehlung                    | Beachtung bei der Planung und dauerhaft                        |
| <b>M08:</b> Die während der Bauphase beanspruchte Fläche ist auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Empfehlung                    | Beachtung bei der Planung sowie während der Ausführung         |
| <b>M09:</b> Im Rahmen der Pflege des Solarparks soll die Vegetation an den Rändern der bzw. in der Geländevertiefung wo möglich mit gemäht werden, um offene Flächen für die Zauneidechse zu gewährleisten und somit das Habitat zu verbessern                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Empfehlung                    | Beachtung bei der Planung und dauerhaft                        |

Ansbach, 15.01.2025

gez. Anita Schäffer

## 6 Literatur, Gesetze und Richtlinien, Internet

### Literatur

- BAYERISCHE STAATSMINISTERIUM FÜR WOHNEN, BAU UND VERKEHR (2018): Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP). (Fassung mit Stand 08/2018).
- BERGMANN, H.-H., HELB, H.-W., BAUMANN, S. (2008): Die Stimmen der Vögel Europas, Aula-Verlag, Wiebelsheim, 672 S.
- BEZZEL, E. (1985): Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Nonpasseriformes – Nichtsingvögel, Bd. 2, Aula-Verlag, Wiesbaden, 792 S.
- BEZZEL, E. (1993): Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Passeres – Singvögel, Bd. 1, Aula-Verlag, Wiesbaden, 766 S.
- BEZZEL, E., GEIERSBERGER, I., LOSSOW, G. V. & PFEIFER, R. (2005): Brutvögel in Bayern Verbreitung 1996 bis 1999, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 560 S.
- DIETZ, C., HELVERSEN O. V. & NILL, D. (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas – Biologie, Kennzeichen, Gefährdung. Franckh-Kosmos-Verlag, Stuttgart, 399 S.
- FORSMAN, D. (2016): Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East, Bloomsbury Natural History, 544 S.
- GLANDT D. (2011): Grundkurs Amphibien- und Reptilienbestimmung - Beobachten, Erfassen und Bestimmen aller europäischen Arten, Quelle&Meyer Verlag GmbH & Co., Wiebelsheim, 411 S.
- GEDEON, K., GRÜNEBERG, C., MITSCHKE, A., SUDFELDT, C. (2014): Atlas Deutscher Brutvogelarten. Atlas of German Breeding Birds. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster, 800 S.
- KELLER, V. HERRANDO, S., VORISEK, P. ET AL (2020): European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.
- KRAPP, F. (Hrsg.) (2011): Die Fledermäuse Europas – Ein umfassendes Handbuch zur Biologie, Verbreitung und Bestimmung. Erweiterte Sonderausgabe aus dem Handbuch der Säugetiere Europas, Aula Verlag, Wiebelsheim, 296 S.
- LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE UND ERHOLUNG (2006): Hinweise zur Anwendung des europäischen Artenschutzes bei der Zulassung von Vorhaben und bei Planungen, beschlossen auf der 93. LANA-Sitzung am 29.05.2006 und gemäß dem Beschluss der 67. UMK.
- LFU (2003): Grundlagen und Bilanzen der Roten Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns ([https://www.lfu.bayern.de/natur/rote\\_liste\\_pflanzen/index.htm](https://www.lfu.bayern.de/natur/rote_liste_pflanzen/index.htm)).
- LFU (2016): Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns – Grundlagen ([https://www.lfu.bayern.de/natur/rote\\_liste\\_tiere/index.htm](https://www.lfu.bayern.de/natur/rote_liste_tiere/index.htm)).

- LFU (2018): Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP). Fassung mit Stand 08/2018.
- LFU Bayern (2020a): Artensteckbriefe zu saP-relevanten Arten. Hg. v. Bayerisches Landesamt für Umwelt. Online verfügbar unter <https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/>, zuletzt aktualisiert im Dezember 2019.
- LFU Bayern (2020b): Internet-Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP). Hg. v. Bayerisches Landesamt für Umwelt. Online verfügbar unter <https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/index.htm>, zuletzt geprüft im Dezember 2019.
- LFU (2020c): Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung – Prüfablauf.
- LFU (2020d): Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung – Zauneidechse.
- LFU (2021): Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung – Feldlerche.
- LFU (2020): saP-Arbeitshilfe Rebhuhn – Relevanzprüfung, Erfassung und Maßnahmen.
- LUDWIG, G., HAUPT, H., GRUTTKE, H. UND BINOT-HAFKE, M. (2009): Methodik der Gefährdungsanalyse für Rote Listen. – In: Haupt, H., Ludwig, G., Gruttke, H., Binot-Hafke, M., Otto, C. und Pauly, A. (Bearb.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 19-71.
- MEBS, T. & SCHMIDT, D. (2014): Die Greifvögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co. KG, Stuttgart, 494 S.
- MESCHÉDE, A. & RUDOLPH, B.-U. (2004): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V. (Hrsg.), Ulmer Verlag, Stuttgart, 411 S.
- SCHEUERPFUG, M. (2020): Untersuchung der Aktivität der Feldlerche (*Alauda arvensis*) in und um Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Hochschule Anhalt Standort Bernburg, Fachbereich 1 Landwirtschaft, Ökotropologie und Landwirtschaft.
- SÜDBECK, P. u. a. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands, Radolfzell, 792 S.

## Gesetze und Richtlinien

- BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (BArtSchV): Verordnung zum Schutz wildlebender Tiere und Pflanzenarten, vom 16.02.2005, (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist.
- BAYERISCHES NATURSCHUTZGESETZ (BAYNATSchG): Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur, vom 23. Februar 2011 (GVBl. S.82). Zuletzt durch Gesetz v. 24. Juli 2019 (GVBl. S. 405) und durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 408) sowie durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 352) geändert.

BUNDESREGIERUNG DEUTSCHLAND (BNATSCHG): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz), ursprünglich: 20. Dezember 1976, (BGBl. I S. 3573, 3574, ber. 1977 I 650 S.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) m.W.v. 31.08.2021.

RICHTLINIE DES RATES 79/409/EWG VOM 02. APRIL 1979: Über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie), ABl. Nr. L 103 vom 25.04.1979, zuletzt geändert durch die Richtlinie des Rates 91/244/EWG vom 08.05.1991 (ABl. Nr.115).

RICHTLINIE DES RATES 92/43/EWG VOM 21. MAI 1992: Zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie), ABl. Nr. L 206 vom 22.07.1992, zuletzt geändert durch die Richtlinie des Rates 97/62/EG vom 08.11.1997 (ABl. Nr. 305).

RICHTLINIE DER KOMMISSION 97/49/EWG VOM 29. JULI 1997: Zur Änderung der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. Amtsblatt Nr. L 223/9 vom 13.08.1997.

RICHTLINIE DES RATES 97/62/EWG VOM 27. OKTOBER 1997: Zur Anpassung der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt, Amtsblatt Nr. L 305/42 vom 08.11.1997.

## Internet

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN UND FÜR HEIMAT (StmF, 2020): Bayern Atlas. Unter Mitarbeit von Euro Geographics Bayerische Vermessungsverwaltung. Online verfügbar unter <https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=umwe&lang=de&bgLayer=atkis>, zuletzt geprüft im November 2024.

FIS-NATUR ONLINE (FIN-Web) ([https://www.lfu.bayern.de/natur/fis\\_natur/fin\\_web/index.htm](https://www.lfu.bayern.de/natur/fis_natur/fin_web/index.htm)).

LfU 2020: Bayerischen Landesamt für Umwelt, Aktuelle Artinformationen zu saP-relevanten Arten (<http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/>), Abruf der Daten am 23.11.2024.



## 7 Anhang

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die vom Bayerischen Landesamt für Umwelt geprüften Artenlisten. Die in den Arteninformationen des LfU zum Download verfügbaren Tabellen beinhalten alle in Bayern aktuell vorkommenden

- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,
- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2016) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste, geschützt nach Europäischer Vogelschutzrichtlinie.

*Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.*

In Bayern ausgestorbene bzw. verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie nicht regelmäßige Gastvögel sind in den Listen nicht enthalten. Von den zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, die im Untersuchungsgebiet als regelmäßiger Gastvogel zu erwarten ist.

Anhand der oben beschriebenen Kriterien wurde durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prüfende Artenspektrum im Untersuchungsgebiet des Vorhabens ermittelt. Die ausführliche Tabellendarstellung dient in erster Linie den Behörden als Checkliste zur Nachvollziehbarkeit der Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums.

Die Artabfrage saP (LfU) erfolgte für den Landkreis Eichstätt.

### **Schritt 1: Relevanzprüfung**

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang):

**V: Wirkraum des Vorhabens liegt:**

**X** = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern

**k.A.** = keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden

**0** = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern

**L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens**

(Lebensraum-Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer):

**X** = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt

**k.A.** = oder keine Angaben möglich

**0** = nicht vorkommend bzw. spezifische Habitatansprüche der Art mit hinreichender Sicherheit nicht erfüllt

**E: Wirkungsempfindlichkeit der Art:**

**X** = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können

**0** = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur weitverbreitete, ungefährdete Arten)

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht-relevant identifiziert und können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausgeschlossen werden. Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.

-----

## **Schritt 2: Bestandsaufnahme**

**NW:** Art im Wirkraum durch Bestandserfassung **nachgewiesen**

**X** = ja

**0** = nein

**PO:** potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein **Vorkommen ist nicht sicher auszuschließen** und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahrscheinlich

**X** = ja

**0** = nein

Die Artentabelle wird seitens des LfU regelmäßig überprüft und ggf. bei neueren Erkenntnissen fortgeschrieben (aktuell aufgrund der Fortschreibung der Roten Liste Vögel Bayern und Deutschland um 5 weitere Vogelarten).

Anhand der unten dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prüfende Artenspektrum im Untersuchungsgebiet ermittelt.

Die ausführliche Tabellendarstellung dient vorrangig als interne Checkliste zur Nachvollziehbarkeit der Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums und als Hilfe für die Abstimmung mit den Naturschutzbehörden. Die Ergebnisse der Auswahl der Arten müssen jedoch in geeigneter Form (z.B. in Form der ausgefüllten Listen) in den Genehmigungsunterlagen dokumentiert und hinreichend begründet werden.

Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der Relevanzprüfung (Schritt 1) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilität zu überprüfen.

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP zugrunde gelegt. Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich.

## **A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie**

Geringfügig modifiziert/optimiert nach Markus Bachmann.

Zur besseren Übersicht wird ab Spalte L nur noch mit X gekennzeichnet.

**Leer bedeutet 0.**

**Tierarten:**

| V                                  | L | E | NW | PO | Artname (deutsch)      | Artname (wiss.)                  | RLB | RLD | sg |
|------------------------------------|---|---|----|----|------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|
| <b>Fledermäuse</b>                 |   |   |    |    |                        |                                  |     |     |    |
| X                                  |   |   |    |    | Bartfledermaus         | <i>Myotis mystacinus</i>         | -   | V   | x  |
| X                                  | X |   |    |    | Bechsteinfledermaus    | <i>Myotis bechsteinii</i>        | 3   | 2   | x  |
| X                                  | X |   |    |    | Brandtfledermaus       | <i>Myotis brandtii</i>           | 2   | V   |    |
| X                                  | X |   |    | X  | Braunes Langohr        | <i>Plecotus auritus</i>          | -   | V   | x  |
| X                                  | X |   |    |    | Breitflügel-Fledermaus | <i>Eptesicus serotinus</i>       | 3   | G   | x  |
| X                                  | X |   |    |    | Fransenfledermaus      | <i>Myotis nattereri</i>          | -   | -   | x  |
| X                                  | X |   |    |    | Graues Langohr         | <i>Plecotus austriacus</i>       | 2   | 2   | x  |
|                                    |   |   |    |    | Große Hufeisennase     | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | 1   | 1   | x  |
| X                                  | X |   |    | X  | Großer Abendsegler     | <i>Nyctalus noctula</i>          | -   | V   | x  |
| X                                  | X |   |    |    | Großes Mausohr         | <i>Myotis myotis</i>             | -   | V   | x  |
|                                    |   |   |    |    | Kleine Hufeisennase    | <i>Rhinolophus hipposideros</i>  | 2   | 1   | x  |
| X                                  |   |   |    |    | Kleinabendsegler       | <i>Nyctalus leisleri</i>         | 2   | D   | x  |
| X                                  | X |   |    |    | Mopsfledermaus         | <i>Barbastella barbastellus</i>  | 3   | 2   | x  |
| X                                  | X |   |    |    | Mückenfledermaus       | <i>Pipistrellus pygmaeus</i>     | V   | D   | x  |
| X                                  | X |   |    |    | Nordfledermaus         | <i>Eptesicus nilssonii</i>       | 3   | G   | x  |
| X                                  | X |   |    | X  | Rauhautfledermaus      | <i>Pipistrellus nathusii</i>     | -   | -   | x  |
| X                                  |   |   |    |    | Wasserfledermaus       | <i>Myotis daubentonii</i>        | -   | -   | x  |
| X                                  |   |   |    |    | Weißrandfledermaus     | <i>Pipistrellus kuhlii</i>       | -   | -   | x  |
| X                                  |   |   |    |    | Wimperfledermaus       | <i>Myotis emarginatus</i>        | 1   | 2   | x  |
| X                                  |   |   |    |    | Zweifelfledermaus      | <i>Vespertilio murinus</i>       | 2   | D   | x  |
| X                                  | X |   |    | X  | Zwergfledermaus        | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | -   | -   | x  |
| <b>Säugetiere ohne Fledermäuse</b> |   |   |    |    |                        |                                  |     |     |    |
|                                    |   |   |    |    | Baumschläfer           | <i>Dryomys nitedula</i>          | 1   | R   | x  |
| X                                  |   |   |    |    | Biber                  | <i>Castor fiber</i>              | -   | V   | x  |
|                                    |   |   |    |    | Birkenmaus             | <i>Sicista betulina</i>          | 2   | 2   | x  |
|                                    |   |   |    |    | Feldhamster            | <i>Cricetus cricetus</i>         | 1   | 1   | x  |
|                                    |   |   |    |    | Fischotter             | <i>Lutra lutra</i>               | 3   | 3   | x  |
| X                                  | X |   |    |    | Haselmaus              | <i>Muscardinus avellanarius</i>  | -   | G   | x  |
|                                    |   |   |    |    | Luchs                  | <i>Lynx lynx</i>                 | 1   | 2   | x  |

| V                  | L | E | NW | PO | Artname (deutsch)        | Artname (wiss.)                | RLB | RLD | sg |
|--------------------|---|---|----|----|--------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|
| X                  |   |   |    |    | Wildkatze                | <i>Felis silvestris</i>        | 2   | 3   | X  |
| <b>Kriechtiere</b> |   |   |    |    |                          |                                |     |     |    |
|                    |   |   |    |    | Äskulapnatter            | <i>Zamenis longissimus</i>     | 1   | 2   | x  |
|                    |   |   |    |    | Europ. Sumpfschildkröte  | <i>Emys orbicularis</i>        | 1   | 1   | x  |
|                    |   |   |    |    | Mauereidechse            | <i>Podarcis muralis</i>        | 1   | V   | x  |
| X                  |   |   |    |    | Schlingnatter            | <i>Coronella austriaca</i>     | 2   | 3   | x  |
|                    |   |   |    |    | Östliche Smaragdeidechse | <i>Lacerta viridis</i>         | 1   | 1   | x  |
| X                  | X | X | X  |    | Zauneidechse             | <i>Lacerta agilis</i>          | 3   | V   | x  |
| <b>Lurche</b>      |   |   |    |    |                          |                                |     |     |    |
|                    |   |   |    |    | Alpensalamander          | <i>Salamandra atra</i>         | -   | -   | x  |
| X                  |   |   |    |    | Europäischer Laubfrosch  | <i>Hyla arborea</i>            | 2   | 3   | x  |
|                    |   |   |    |    | Geburtshelferkröte       | <i>Alytes obstetricans</i>     | 1   | 3   | x  |
| X                  |   |   |    |    | Gelbbauchunke            | <i>Bombina variegata</i>       | 2   | 2   | x  |
| X                  |   |   |    |    | Kleiner Wasserfrosch     | <i>Pelophylax lessonae</i>     | D   | G   | x  |
| X                  |   |   |    |    | Knoblauchkröte           | <i>Pelobates fuscus</i>        | 2   | 3   | x  |
| X                  |   |   |    |    | Kreuzkröte               | <i>Epidalea calamita</i>       | 2   | V   | x  |
| X                  |   |   |    |    | Moorfrosch               | <i>Rana arvalis</i>            | 1   | 3   | x  |
| X                  |   |   |    |    | Nördlicher Kammolch      | <i>Triturus cristatus</i>      | 2   | V   | x  |
| X                  |   |   |    |    | Springfrosch             | <i>Rana dalmatina</i>          | 3   | -   | x  |
| X                  |   |   |    |    | Wechselkröte             | <i>Bufo viridis</i>            | 1   | 3   | x  |
| <b>Fische</b>      |   |   |    |    |                          |                                |     |     |    |
|                    |   |   |    |    | Donaukaulbarsch          | <i>Gymnocephalus baloni</i>    | -   | -   | x  |
| <b>Libellen</b>    |   |   |    |    |                          |                                |     |     |    |
|                    |   |   |    |    | Asiatische Keiljungfer   | <i>Gomphus flavipes</i>        | 3   | -   | x  |
|                    |   |   |    |    | Östliche Moosjungfer     | <i>Leucorrhinia albifrons</i>  | 1   | 2   | x  |
|                    |   |   |    |    | Zierliche Moosjungfer    | <i>Leucorrhinia caudalis</i>   | 1   | 3   | x  |
|                    |   |   |    |    | Große Moosjungfer        | <i>Leucorrhinia pectoralis</i> | 2   | 3   | x  |
| X                  |   |   |    |    | GrüneFlussjungfer        | <i>Ophiogomphus cecilia</i>    | V   | -   | x  |
|                    |   |   |    |    | Sibirische Winterlibelle | <i>Sympecma paedisca</i>       | 2   | 1   | x  |
| <b>Käfer</b>       |   |   |    |    |                          |                                |     |     |    |
|                    |   |   |    |    | Großer Eichenbock        | <i>Cerambyx cerdo</i>          | 1   | 1   | x  |



| V                  | L | E | NW | PO | Artname (deutsch)                    | Artname (wiss.)                         | RLB | RLD | sg |
|--------------------|---|---|----|----|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|----|
|                    |   |   |    |    | Schwarzer Grubenlaufkäfer            | <i>Carabus nodulosus</i>                | 1   | 1   | x  |
|                    |   |   |    |    | Scharlach-Plattkäfer                 | <i>Cucujus cinnaberinus</i>             | R   | 1   | x  |
|                    |   |   |    |    | Breitrand                            | <i>Dytiscus latissimus</i>              | 1   | 1   | x  |
| x                  |   |   |    |    | Eremit                               | <i>Osmoderma eremita</i>                | 2   | 2   | x  |
|                    |   |   |    |    | Alpenbock                            | <i>Rosalia alpina</i>                   | 2   | 2   | x  |
| <b>Tagfalter</b>   |   |   |    |    |                                      |                                         |     |     |    |
| x                  |   |   |    |    | Apollofalter                         | <i>Parnassius apollo</i>                | 2   | 2   | x  |
|                    |   |   |    |    | Blauschillernder Feuerfalter         | <i>Lycaena helle</i>                    | 1   | 2   | x  |
| x                  |   |   |    |    | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  | <i>Phengaris [Maculinea] nausithous</i> | V   | V   | x  |
|                    |   |   |    |    | Flussampfer-Dukatenfalter            | <i>Lycaena dispar</i>                   | -   | 3   | x  |
|                    |   |   |    |    | Gelbringfalter                       | <i>Lopinga achine</i>                   | 2   | 2   | x  |
|                    |   |   |    |    | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling   | <i>Phengaris [Maculinea] teleius</i>    | 2   | 2   | x  |
|                    |   |   |    |    | Kleiner Maivogel                     | <i>Euphydryas maturna</i>               | 1   | 1   | x  |
|                    |   |   |    |    | Moor-Wiesenvöglechen                 | <i>Coenonympha oedippus</i>             | 1   | 1   | x  |
|                    |   |   |    |    | Quendel-Ameisenbläuling              | <i>Phengaris [Maculinea] arion</i>      | 2   | 3   | x  |
|                    |   |   |    |    | Schwarzer Apollo                     | <i>Parnassius mnemosyne</i>             | 2   | 2   | x  |
|                    |   |   |    |    | Wald-Wiesenvögelchen                 | <i>Coenonympha hero</i>                 | 2   | 2   | x  |
| <b>Nachtfalter</b> |   |   |    |    |                                      |                                         |     |     |    |
|                    |   |   |    |    | Heckenwollfalter                     | <i>Eriogaster catax</i>                 | 1   | 1   | x  |
|                    |   |   |    |    | Haarstrangwurzeleule                 | <i>Gortyna borelii</i>                  | 1   | 1   | x  |
| x                  |   |   |    |    | Nachtkerzenschwärmer                 | <i>Proserpinus proserpina</i>           | V   | -   | x  |
| <b>Schnecken</b>   |   |   |    |    |                                      |                                         |     |     |    |
|                    |   |   |    |    | Zierliche Tellerschnecke             | <i>Anisus vorticulus</i>                | 1   | 1   | x  |
|                    |   |   |    |    | Gebänderte Kahnschnecke              | <i>Theodoxus transversalis</i>          | 1   | 1   | x  |
| <b>Muscheln</b>    |   |   |    |    |                                      |                                         |     |     |    |
| x                  |   |   |    |    | Bachmuschel,<br>Gemeine Flussmuschel | <i>Unio crassus agg.</i>                | 1   | 1   | x  |

### Gefäßpflanzen:

| V | L | E | NW | PO | Artnamen (deutsch)           | Artnamen (wiss.)                      | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|----|
|   |   |   |    |    | Bayerisches Federgras        | <i>Stipa pulcherrima ssp. bavaria</i> | 1   | 1   | x  |
|   |   |   |    |    | Bodensee-Vergissmeinnicht    | <i>Myosotis rehsteineri</i>           | 1   | 1   | x  |
|   |   |   |    |    | Böhmischer Fransenenzian     | <i>Gentianella bohemica</i>           | 1   | 1   | x  |
|   |   |   |    |    | Braungrüner Streifenfarn     | <i>Asplenium adulterinum</i>          | 2   | 2   | x  |
| X |   |   |    |    | Dicke Trespe                 | <i>Bromus grossus</i>                 | 1   | 2   | x  |
| X |   |   |    |    | Europäischer Frauenschuh     | <i>Cypripedium calceolus</i>          | 3   | 3   | x  |
|   |   |   |    |    | Finger-Küchenschelle         | <i>Pulsatilla patens</i>              | 1   | 1   | x  |
|   |   |   |    |    | Froschkraut                  | <i>Luronium natans</i>                | 0   | 2   | x  |
|   |   |   |    |    | Herzlöffel                   | <i>Caldesia parnassifolia</i>         | 1   | 1   | x  |
|   |   |   |    |    | Kriechender Sellerie         | <i>Helosciadium repens</i>            | 2   | 1   | x  |
|   |   |   |    |    | Liegendes Büchsenkraut       | <i>Lindernia procumbens</i>           | 2   | 2   | x  |
|   |   |   |    |    | Lilienblättrige Becherglocke | <i>Adenophora liliifolia</i>          | 1   | 1   | x  |
|   |   |   |    |    | Prächtiger Dünnfarn          | <i>Trichomanes speciosum</i>          | R   | -   | x  |
|   |   |   |    |    | Sand-Silberscharte           | <i>Jurinea cyanoides</i>              | 1   | 2   | x  |
|   |   |   |    |    | Sommer-Wendelähre            | <i>Spiranthes aestivalis</i>          | 2   | 2   | x  |
| X |   |   |    |    | Sumpf-Glanzkraut             | <i>Liparis loeselii</i>               | 2   | 2   | x  |
| X |   |   |    |    | Sumpf-Siegwurz               | <i>Gladiolus palustris</i>            | 2   | 2   | x  |

### B Vögel

Geringfügig modifiziert/optimiert nach Markus Bachmann.

Zur besseren Übersicht wird ab Spalte L nur noch mit X gekennzeichnet.

**Leer bedeutet 0.**

**Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (2005 bis 2009 nach Rödl et al. 2012)** ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste

| V | L | E | NW | PO | Artnamen (deutsch) | Artnamen (wiss.)         | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|--------------------|--------------------------|-----|-----|----|
| X | X |   | X  |    | Amsel*)            | <i>Turdus merula</i>     | -   | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Auerhuhn           | <i>Tetrao urogallus</i>  | 1   | 1   | x  |
| X | X |   | X  |    | Bachstelze*)       | <i>Motacilla alba</i>    | -   | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Bartmeise          | <i>Panurus biarmicus</i> | R   | -   | -  |
| X | X |   |    |    | Baumfalke          | <i>Falco subbuteo</i>    | -   | 3   | x  |

| V | L | E | NW | PO | Artname (deutsch)      | Artname (wiss.)                  | RLB  | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|------------------------|----------------------------------|------|-----|----|
| X |   |   |    |    | Baumpieper             | <i>Anthus trivialis</i>          | 2    | 3   | -  |
| X |   |   |    |    | Bekassine              | <i>Gallinago gallinago</i>       | 1    | 1   | x  |
|   |   |   |    |    | Bergfink               | <i>Fringilla montifringilla</i>  | -    | -   |    |
|   |   |   |    |    | Berglaubsänger         | <i>Phylloscopus bonelli</i>      | -    | -   | x  |
|   |   |   |    |    | Bergpieper             | <i>Anthus spinoletta</i>         | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Beutelmeise            | <i>Remiz pendulinus</i>          | V    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Bienenfresser          | <i>Merops apiaster</i>           | R    | -   | x  |
|   |   |   |    |    | Birkhuhn               | <i>Tetrao tetrix</i>             | 1    | 1   | x  |
|   |   |   |    |    | Blässgans              | <i>Anser albifrons</i>           | -    | -   |    |
| X |   |   |    |    | Blässhuhn*)            | <i>Fulica atra</i>               | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Blaukehlchen           | <i>Luscinia svecica</i>          | -    | -   | x  |
| X | X |   |    | X  | Blaumeise*)            | <i>Parus caeruleus</i>           | -    | -   | -  |
| X | X |   |    |    | Bluthänfling           | <i>Carduelis cannabina</i>       | 2    | 3   | -  |
|   |   |   |    |    | Brachpieper            | <i>Anthus campestris</i>         | 0    | 1   | x  |
|   |   |   |    |    | Brandgans/Brandente    | <i>Tadorna tadorna</i>           | R    | -   | -  |
| X | X |   | X  |    | Braunkehlchen          | <i>Saxicola rubetra</i>          | 1    | 2   | -  |
| X | X |   | X  |    | Buchfink*)             | <i>Fringilla coelebs</i>         | -    | -   | -  |
| X | X |   | X  |    | Buntspecht*)           | <i>Dendrocopos major</i>         | -    | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Dohle                  | <i>Corvus monedula</i>           | V    | -   | -  |
| X | X |   | X  |    | Dorngrasmücke          | <i>Sylvia communis</i>           | V    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Dreizehenspecht        | <i>Picoides tridactylus</i>      | -    | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Drosselrohrsänger      | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | 3    | -   | x  |
| X | X |   |    | X  | Eichelhäher*)          | <i>Garrulus glandarius</i>       | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Eiderente*)            | <i>Somateria mollissima</i>      | n.b. | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Eisvogel               | <i>Alcedo atthis</i>             | 3    | -   | x  |
| X | X |   | X  |    | Elster*)               | <i>Pica pica</i>                 | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Erlenzeisig            | <i>Carduelis spinus</i>          | -    | -   | -  |
| X | X | X | X  |    | Feldlerche             | <i>Alauda arvensis</i>           | 3    | 3   | -  |
| X |   |   |    |    | Feldschwirl            | <i>Locustella naevia</i>         | V    | 3   | -  |
| X | X |   |    | X  | Feldsperling           | <i>Passer montanus</i>           | V    | V   | -  |
| X |   |   |    |    | Fichtenkreuzschnabel*) | <i>Loxia curvirostra</i>         | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Fischadler             | <i>Pandion haliaetus</i>         | 1    | 3   | x  |

| V | L | E | NW | PO | Artname (deutsch)              | Artname (wiss.)                | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|--------------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|
| X | X |   |    | X  | Fitis <sup>*)</sup>            | <i>Phylloscopus trochilus</i>  | -   | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Flussregenpfeifer              | <i>Charadrius dubius</i>       | 3   | -   | x  |
|   |   |   |    |    | Flusseeschwalbe                | <i>Sterna hirundo</i>          | 3   | 2   | x  |
| X |   |   |    |    | Flussuferläufer                | <i>Actitis hypoleucos</i>      | 1   | 2   | x  |
| X |   |   |    |    | Gänsesäger                     | <i>Mergus merganser</i>        | -   | V   | -  |
| X | X |   |    |    | Gartenbaumläufer <sup>*)</sup> | <i>Certhia brachydactyla</i>   | -   | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Gartengrasmücke <sup>*)</sup>  | <i>Sylvia borin</i>            | -   | -   | -  |
| X | X |   |    |    | Gartenrotschwanz               | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | 3   | V   | -  |
| X |   |   |    |    | Gebirgsstelze <sup>*)</sup>    | <i>Motacilla cinerea</i>       | -   | -   | -  |
| X | X |   |    |    | Gelbspötter                    | <i>Hippolais icterina</i>      | 3   | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Gimpel <sup>*)</sup>           | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>       | -   | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Girlitz <sup>*)</sup>          | <i>Serinus serinus</i>         | -   | -   | -  |
| X | X |   | X  |    | Goldammer                      | <i>Emberiza citrinella</i>     | -   | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Goldregenpfeifer               | <i>Pluvialis apricaria</i>     | -   | 1   |    |
|   |   |   |    |    | Grauammer                      | <i>Miliaria calandra</i>       | 1   | V   | x  |
| X |   |   |    |    | Graugans                       | <i>Anser anser</i>             | -   | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Graureiher                     | <i>Ardea cinerea</i>           | V   | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Grauschnäpper <sup>*)</sup>    | <i>Muscicapa striata</i>       | -   | V   | -  |
| X |   |   |    |    | Grauspecht                     | <i>Picus canus</i>             | 3   | 2   | x  |
| X |   |   |    |    | Großer Brachvogel              | <i>Numenius arquata</i>        | 1   | 1   | x  |
| X | X |   | X  |    | Grünfink <sup>*)</sup>         | <i>Carduelis chloris</i>       | -   | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Grünspecht                     | <i>Picus viridis</i>           | -   | -   | x  |
| X | X |   |    |    | Habicht                        | <i>Accipiter gentilis</i>      | V   | -   | x  |
|   |   |   |    |    | Habichtskauz                   | <i>Strix uralensis</i>         | R   | R   | x  |
| X |   |   |    |    | Halsbandschnäpper              | <i>Ficedula albicollis</i>     | 3   | 3   | x  |
| X |   |   |    |    | Haselhuhn                      | <i>Tetrastes bonasia</i>       | 3   | 2   | -  |
|   |   |   |    |    | Haubenlerche                   | <i>Galerida cristata</i>       | 1   | 1   | x  |
| X | X |   |    |    | Haubenmeise <sup>*)</sup>      | <i>Parus cristatus</i>         | -   | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Haubentaucher                  | <i>Podiceps cristatus</i>      | -   | -   | -  |
| X | X |   | X  |    | Hausrotschwanz <sup>*)</sup>   | <i>Phoenicurus ochruros</i>    | -   | -   | -  |
| X | X |   | X  |    | Hausperling                    | <i>Passer domesticus</i>       | V   | V   | -  |
| X | X |   |    | X  | Heckenbraunelle <sup>*)</sup>  | <i>Prunella modularis</i>      | -   | -   | -  |

| V | L | E | NW | PO | Artname (deutsch) | Artname (wiss.)                      | RLB  | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|-------------------|--------------------------------------|------|-----|----|
| X |   |   |    |    | Heidelerche       | <i>Lullula arborea</i>               | 2    | V   | x  |
| X |   |   |    |    | Höckerschwan      | <i>Cygnus olor</i>                   | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Hohltaube         | <i>Columba oenas</i>                 | -    | -   | -  |
| X | X |   |    |    | Jagdfasan*)       | <i>Phasianus colchicus</i>           | n.b. | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Kanadagans        | <i>Branta canadensis</i>             | n.b. | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Karmingimpel      | <i>Carpodacus erythrinus</i>         | 1    | -   | x  |
| X | X |   |    |    | Kernbeißer*)      | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Kiebitz           | <i>Vanellus vanellus</i>             | 2    | 2   | x  |
| X | X |   |    | X  | Klappergrasmücke  | <i>Sylvia curruca</i>                | 3    | -   | -  |
| X | X |   | X  |    | Kleiber*)         | <i>Sitta europaea</i>                | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Kleines Sumpfhuhn | <i>Porzana parva</i>                 | n.b. | 3   | x  |
| X |   |   |    |    | Kleinspecht       | <i>Dendrocopos minor</i>             | V    | V   | -  |
| X |   |   |    |    | Knäkente          | <i>Anas querquedula</i>              | 1    | 2   | x  |
| X | X |   | X  |    | Kohlmeise*)       | <i>Parus major</i>                   | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Kolbenente        | <i>Netta rufina</i>                  | -    | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Kolkrabe          | <i>Corvus corax</i>                  | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Kormoran          | <i>Phalacrocorax carbo</i>           | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Kornweihe         | <i>Circus cyaneus</i>                |      |     |    |
|   |   |   |    |    | Kranich           | <i>Grus grus</i>                     | 1    | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Krickente         | <i>Anas crecca</i>                   | 3    | 3   | -  |
| X | X |   |    | X  | Kuckuck           | <i>Cuculus canorus</i>               | V    | V   | -  |
| X |   |   |    |    | Lachmöwe          | <i>Chroicocephalus ridibundus</i>    | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Löffelente        | <i>Anas clypeata</i>                 | 1    | 3   | -  |
| X | X |   | X  |    | Mauersegler       | <i>Apus apus</i>                     | 3    | -   | -  |
| X | X |   | X  |    | Mäusebussard      | <i>Buteo buteo</i>                   | -    | -   | x  |
| X | X |   | X  |    | Mehlschwalbe      | <i>Delichon urbicum</i>              | 3    | 3   | -  |
| X | X |   |    |    | Misteldrossel*)   | <i>Turdus viscivorus</i>             | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Mittelmeermöwe    | <i>Larus michahellis</i>             | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Mittelspecht      | <i>Dendrocopos medius</i>            | -    | -   | x  |
| X | X |   | X  |    | Mönchsgrasmücke*) | <i>Sylvia atricapilla</i>            | -    | -   | -  |
| X | X |   |    |    | Nachtigall        | <i>Luscinia megarhynchos</i>         | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Nachtreiher       | <i>Nycticorax nycticorax</i>         | R    | 2   | x  |



| V | L | E | NW | PO | Artname (deutsch)  | Artname (wiss.)                   | RLB  | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|--------------------|-----------------------------------|------|-----|----|
| X | X |   |    | X  | Neuntöter          | <i>Lanius collurio</i>            | V    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Ortolan            | <i>Emberiza hortulana</i>         | 1    | 3   | x  |
| X |   |   |    |    | Pfeifente          | <i>Mareca penelope</i>            | 0    | R   |    |
| X | X |   |    |    | Pirol              | <i>Oriolus oriolus</i>            | V    | V   | -  |
|   |   |   |    |    | Purpureiher        | <i>Ardea purpurea</i>             | R    | R   | x  |
| X | X |   |    | X  | Rabenkrähe*)       | <i>Corvus corone</i>              | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Raubwürger         | <i>Lanius excubitor</i>           | 1    | 2   | x  |
| X |   |   |    |    | Rauchschwalbe      | <i>Hirundo rustica</i>            | V    | 3   | -  |
| X |   |   |    |    | Raufußkauz         | <i>Aegolius funereus</i>          | -    | -   | x  |
| X | X |   |    |    | Rebhuhn            | <i>Perdix perdix</i>              | 2    | 2   | -  |
| X |   |   |    |    | Reiherente*)       | <i>Aythya fuligula</i>            | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Ringdrossel        | <i>Turdus torquatus</i>           | -    | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Ringeltaube*)      | <i>Columba palumbus</i>           | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Rohrammer*)        | <i>Emberiza schoeniclus</i>       | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Rohrdommel         | <i>Botaurus stellaris</i>         | 1    | 3   | x  |
| X |   |   |    |    | Rohrschwirl        | <i>Locustella luscinioides</i>    | -    | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Rohrweihe          | <i>Circus aeruginosus</i>         | -    | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Rostgans           | <i>Tadorna ferruginea</i>         | n.b. | -   |    |
| X | X |   | X  |    | Rotkehlchen*)      | <i>Erithacus rubecula</i>         | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Rotdrossel         | <i>Turdus iliacus</i>             | -    | -   |    |
| X | X |   | X  |    | Rotmilan           | <i>Milvus milvus</i>              | V    | V   | x  |
|   |   |   |    |    | Rotschenkel        | <i>Tringa totanus</i>             | 1    | 3   | x  |
| X |   |   |    |    | Saatkrähe          | <i>Corvus frugilegus</i>          | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Schellente         | <i>Bucephala clangula</i>         | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Schilfrohrsänger   | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | -    | -   | x  |
|   |   |   |    |    | Schlagschwirl      | <i>Locustella fluviatilis</i>     | V    | -   | -  |
| X | X |   |    |    | Schleiereule       | <i>Tyto alba</i>                  | 3    | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Schnatterente      | <i>Anas strepera</i>              | -    | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Schwanzmeise*)     | <i>Aegithalos caudatus</i>        | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Schwarzhalstaucher | <i>Podiceps nigricollis</i>       | 2    | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Schwarzkehlchen    | <i>Saxicola torquata</i>          | V    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Schwarzkopfmöwe    | <i>Larus melanocephalus</i>       | R    | -   | -  |

| V | L | E | NW | PO | Artname (deutsch)                | Artname (wiss.)                   | RLB  | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|----------------------------------|-----------------------------------|------|-----|----|
| X |   |   |    |    | Schwarzmilan                     | <i>Milvus migrans</i>             | -    | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Schwarzspecht                    | <i>Dryocopus martius</i>          | -    | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Schwarzstorch                    | <i>Ciconia nigra</i>              | -    | -   | x  |
|   |   |   |    |    | Seeadler                         | <i>Haliaeetus albicilla</i>       | R    | -   |    |
|   |   |   |    |    | Seidenreiher                     | <i>Egretta garzetta</i>           | n.b. | -   | x  |
|   |   |   |    |    | Silberreiher                     | <i>Egretta alba</i>               | -    | -   |    |
| X | X |   |    | X  | Singdrossel <sup>*)</sup>        | <i>Turdus philomelos</i>          | -    | -   | -  |
| X | X |   |    |    | Sommergoldhähnchen <sup>*)</sup> | <i>Regulus ignicapillus</i>       | -    | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Sperber                          | <i>Accipiter nisus</i>            | -    | -   | x  |
|   |   |   |    |    | Sperbergrasmücke                 | <i>Sylvia nisoria</i>             | 1    | 3   | x  |
| X |   |   |    |    | Sperlingskauz                    | <i>Glaucidium passerinum</i>      | -    | -   | x  |
| X | X |   | X  |    | Star                             | <i>Sturnus vulgaris</i>           | -    | 3   | -  |
|   |   |   |    |    | Steinkauz                        | <i>Athene noctua</i>              | 3    | 3   | x  |
|   |   |   |    |    | Steinschmätzer                   | <i>Oenanthe oenanthe</i>          | 1    | 1   | -  |
| X | X |   | X  |    | Stieglitz                        | <i>Carduelis carduelis</i>        | V    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Stockente <sup>*)</sup>          | <i>Anas platyrhynchos</i>         | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Straßentaube <sup>*)</sup>       | <i>Columba livia f. domestica</i> | n.b. | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Sturmmöwe                        | <i>Larus canus</i>                | R    | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Sumpfmeise <sup>*)</sup>         | <i>Parus palustris</i>            | -    | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Sumpfohreule                     | <i>Asio flammeus</i>              | 0    | 1   |    |
| X |   |   |    |    | Sumpfrohrsänger <sup>*)</sup>    | <i>Acrocephalus palustris</i>     | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Tafelente                        | <i>Aythya ferina</i>              | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Tannenhäher <sup>*)</sup>        | <i>Nucifraga caryocatactes</i>    | -    | -   | -  |
| X | X |   | X  |    | Tannenmeise <sup>*)</sup>        | <i>Parus ater</i>                 | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Teichhuhn                        | <i>Gallinula chloropus</i>        | -    | V   | x  |
| X |   |   |    |    | Teichrohrsänger                  | <i>Acrocephalus scirpaceus</i>    | -    | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Trauerschnäpper                  | <i>Ficedula hypoleuca</i>         | V    | 3   | -  |
| X |   |   |    |    | Tüpfelsumpfhuhn                  | <i>Porzana porzana</i>            | 1    | 3   | x  |
| X | X |   |    |    | Türkentaube <sup>*)</sup>        | <i>Streptopelia decaocto</i>      | -    | -   | -  |
| X | X |   | X  |    | Turmfalke                        | <i>Falco tinnunculus</i>          | -    | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Turteltaube                      | <i>Streptopelia turtur</i>        | 2    | 2   | x  |
|   |   |   |    |    | Uferschnepfe                     | <i>Limosa limosa</i>              | 1    | 1   | x  |

| V | L | E | NW | PO | Artname (deutsch)                | Artname (wiss.)                | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|----------------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|
| X |   |   |    |    | Uferschwalbe                     | <i>Riparia riparia</i>         | V   | V   | x  |
| X |   |   |    |    | Uhu                              | <i>Bubo bubo</i>               | -   | -   | x  |
| X | X |   | X  |    | Wacholderdrossel <sup>*)</sup>   | <i>Turdus pilaris</i>          | -   | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Wachtel                          | <i>Coturnix coturnix</i>       | 3   | V   | -  |
| X |   |   |    |    | Wachtelkönig                     | <i>Crex crex</i>               | 2   | 2   | x  |
| X | X |   |    | X  | Waldbaumläufer <sup>*)</sup>     | <i>Certhia familiaris</i>      | -   | -   | -  |
| X | X |   |    | X  | Waldkauz                         | <i>Strix aluco</i>             | -   | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Waldlaubsänger                   | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | 2   | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Waldohreule                      | <i>Asio otus</i>               | -   | -   | x  |
|   |   |   |    |    | Waldrapp                         | <i>Geronticus eremita</i>      | 0   | 0   |    |
| X |   |   |    |    | Waldschnepfe                     | <i>Scolopax rusticola</i>      | -   | V   | -  |
| X |   |   |    |    | Waldwasserläufer                 | <i>Tringa ochropus</i>         | R   | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Wanderfalke                      | <i>Falco peregrinus</i>        | -   | -   | x  |
| X |   |   |    |    | Wasseramsel                      | <i>Cinclus cinclus</i>         | -   | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Wasserralle                      | <i>Rallus aquaticus</i>        | 3   | V   | -  |
| X | X |   |    | X  | Weidenmeise <sup>*)</sup>        | <i>Parus montanus</i>          | -   | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Weißrückenspecht                 | <i>Dendrocopos leucotus</i>    | 3   | 2   | x  |
| X |   |   |    |    | Weißstorch                       | <i>Ciconia ciconia</i>         | -   | 3   | x  |
| X |   |   |    |    | Wendehals                        | <i>Jynx torquilla</i>          | 1   | 2   | x  |
| X |   |   |    |    | Wespenbussard                    | <i>Pernis apivorus</i>         | V   | 3   | x  |
| X | X |   |    |    | Wiedehopf                        | <i>Upupa epops</i>             | 1   | 3   | x  |
|   |   |   |    |    | Wiesenpieper                     | <i>Anthus pratensis</i>        | 1   | 2   | -  |
| X | X |   |    |    | Wiesenschafstelze                | <i>Motacilla flava</i>         | -   | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Wiesenweihe                      | <i>Circus pygargus</i>         | R   | 2   | x  |
| X | X |   | X  |    | Wintergoldhähnchen <sup>*)</sup> | <i>Regulus regulus</i>         | -   | -   | -  |
| X | X |   | X  |    | Zaunkönig <sup>*)</sup>          | <i>Troglodytes troglodytes</i> | -   | -   | -  |
| X |   |   |    |    | Ziegenmelker                     | <i>Caprimulgus europaeus</i>   | 1   | 3   | x  |
| X | X |   | X  |    | Zilpzalp <sup>*)</sup>           | <i>Phylloscopus collybita</i>  | -   | -   | -  |
|   |   |   |    |    | Zippammer                        | <i>Emberiza cia</i>            | R   | 1   | x  |
| X |   |   |    |    | Zwergdommel                      | <i>Ixobrychus minutus</i>      | 1   | 2   | x  |
|   |   |   |    |    | Zwergohreule                     | <i>Otus scops</i>              | R   | -   | x  |
|   |   |   |    |    | Zwergschnäpper                   | <i>Ficedula parva</i>          | 2   | V   | x  |

| V | L | E | NW | PO | Artname (deutsch)          | Artname (wiss.)               | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|----------------------------|-------------------------------|-----|-----|----|
|   |   |   |    |    | Zwergsäger                 | <i>Mergellus albellus</i>     | -   | -   |    |
| X |   |   |    |    | Zwergtaucher <sup>*)</sup> | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | -   | -   | -  |

<sup>\*)</sup> weit verbreitete Arten ("Allerweltsarten"), bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Vgl. Abschnitt "Relevanzprüfung" der Internet-Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenzulassung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt.